

□ / □ / □	□ / □ / □	□ / □ / □
-----------	-----------	-----------

توصیه و درمان	طبقه بندی	ارزیابی
		<p>اگر کودک به علت حادثه یا سایر علائم جراحی فوری مراجعه کرده است:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • رنگ پریدگی • خونریزی خارجی • علائم عفونت موضعی • عدم توانایی در حرکت دادن اندام
		<p>اگر کودک با سابقه سوختگی مراجعه کرده است</p> <ul style="list-style-type: none"> • نوع سوختگی ها (درجه I, II, III): - درجه II (سوختگی با ضخامت نسبی) - درجه III (سوختگی عمیق) • محل • درصد سوختگی • درجه II و III (رامطابق جدول زیر مشخص کنید) • نشانه های عفونت • آسیب های همراه (مثل شکستگی) • احتمال child abuse
		<p>اگر کودک با سابقه بلع فراورده های نفتی مراجعه کرده است :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • سرفه و تنفس مشکل • بویی که احتمال استفاده از مواد نفتی (نفت، بنزین، گازوئیل) را قطعی کند
		<p>اگر کودک با سابقه تماس با بلع مواد سوزاننده مراجعه کرده است :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • سوختگی دهان و یا مشکل بلع • بویی که احتمال استفاده از مواد سوزاننده را قطعی کند
		<p>اگر کودک با سابقه بلع مواد حشره کش و سموم گیاهی مراجعه کرده است:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • اندازه مردمک ها • نشانه های کولینرژیک*
		<p>اگر کودک با سابقه مسمومیت دارویی یا مواد مخدر مراجعه کرده است:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • علائم شوک • تنفس مشکل • هیپوترمی • هیپوترمی • علائم کولینرژیک و آنتی کولینرژیک
		<p>اگر کودک با سابقه مارگزیدگی مراجعه کرده است :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • درد موضعی یا تورم • تکرور موضعی • ادرار سیاه • مشکل در بلعیدن و صحبت کردن • مشکل تنفسی • افتادگی پلک و فلج عضلات • خونریزی خارجی از لثه ها ، زخم ها • و علائم خونریزی داخلی • *ازمون لخته مثبت
		<p>اگر کودک با سابقه گزش حشرات ، عقرب یا رطیل مراجعه کرده است</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • علائم شوک مانند تعریق ناگهانی یا اندام های سرد • تنفس مشکل یا خرخر • اختلال دید • درد عضلانی متناوب • محل گزیدگی یا وجود نیش
		<p>اگر کودک با سابقه گازگرفتگی مراجعه کرده است :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • تب، ضعف، بی اشتها • ظهور ناگهانی علائم عصبی • مانند تحریک پذیری ، ترس از آب یا نور، افزایش ترشح بزاق • فلج شل پایین رونده

□ ادامه درمان و توصیه ها □ ارجاع به	□ فرقی نگرفته یا بدتر شده □ بهتر شده	در مراجعه مجدد: تاریخ/...../..... بیماری کودک
--	---	---